

LA FIEVRE APHTEUSE AUX PAYS-BAS

Décembre 1983 - Février 1984

=====

A la fin de l'année dernière, plusieurs foyers de fièvre aphteuse sont apparus aux Pays-Bas.

- . 30 décembre 1983. Premiers cas observés sur deux veaux d'un élevage laitier du village de Nagele dans le Noordoost-Polder.
- . Trois autres exploitations voisines sont contaminées.
- . Une exploitation susceptible d'être contaminée est considérée comme atteinte.

Dans les cinq cas, tous les animaux présents ont été abattus et détruits les 30 et 31 décembre. Au total : 145 vaches laitières, 39 génisses, 51 jeunes bovins, 614 jeunes veaux, 74 taurillons d'engraissement et 110 porcs. Sur cet ensemble, seuls 12 veaux présentaient des signes cliniques.

Les mesures de police sanitaire (vaccination, interdiction de déplacement des animaux) ont été étendues à l'ensemble du Noordoost-Polder et du Polder de Flevoland.

- . 20 janvier 1984. Nouveaux cas observés sur des veaux d'un élevage de Lambertschaag, province de Hollande septentrionale. Les mesures sanitaires prises concernent la partie nord de la province (au-dessus d'une ligne Est-Ouest passant par Alkmaar).
- . 2 février 1984. Un autre foyer est diagnostiqué dans une ferme proche de la précédente à Lambertschaag.

Dans les deux cas tous les animaux sensibles des exploitations touchées sont abattus et les mesures de police sanitaire sont les mêmes que lors des premiers foyers.

- . Le 9 mars toutes les mesures de restriction ont été levées.

La carte ci-jointe illustre les zones contaminées et situe l'Institut Vétérinaire Central néerlandais (Lelystad).

Dans tous les foyers, le virus isolé était le même : type 0.

F. MOUTOU

Foyers de fièvre aphteuse aux Pays-Bas pendant l'hiver 1983-1984.

